



REDE SARAH

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

SIMULADO IV



1. **(Rede Sarah / 2012)** Um indivíduo com diabetes mellitus tipo 1, internado em uma unidade de terapia intensiva há 3 dias, está apresentando hiperglicemia de difícil controle. A prescrição médica é de 100 Unidades Internacionais de insulina – diluída em 100 ml de solução salina 0,9% e soroterapia – 1000 ml de solução salina 0,45% por via endovenosa em 12 horas. Qual tipo de insulina deve ser administrada, preferencialmente por via endovenosa, e quantos ml de Cloreto de Sódio 20% (ampolas de 10 ml) são necessários para preparar o soro prescrito, utilizando-se 1000 ml de água destilada?
Assinale a alternativa correta.
- Insulina regular humana e 45 ml de Cloreto de Sódio 20%.
 - Insulina regular humana e 22,5 ml de Cloreto de Sódio 20%.
 - Insulina NPH e 45 ml de Cloreto de Sódio 20%.
 - Insulina NPH e 22,5 ml de Cloreto de Sódio 20%.
2. **(Rede Sarah / 2012)** A reação hemolítica aguda habitualmente deve-se à incompatibilidade dentro do sistema ABO. É considerada uma reação extremamente grave e de mau prognóstico, estando sua gravidade diretamente relacionada ao volume de hemácias infundido e às medidas tomadas. Não são sinais e sintoma dessa reação:
- Ansiedade, inquietação e sensação de morte iminente.
 - Dor no tórax, no local de infusão e ou nos flancos.
 - Hipotensão grave e hemoglobinúria.
 - Hipotermia e transpiração excessiva.
3. **(Rede Sarah / 2012)** Ao terminar a aplicação de insulina regular via subcutânea em um indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, um técnico de enfermagem percebeu que administrou 20 Unidades Internacionais ao invés de 2 Unidades Internacionais. Com base no pico de ação desse tipo de insulina, é correto afirmar que a hipoglicemia deverá ocorrer entre:
- 6 a 8 horas
 - 4 a 10 horas
 - 2 a 3 horas
 - Nenhuma das alternativas anteriores está correta
4. **(Rede Sarah / 2012)** Um paciente de 60 anos foi internado devido a seqüela de acidente vascular encefálico e está com uma sonda vesical de demora. Em relação aos cuidados de enfermagem com a sonda vesical, indique V (verdadeiro) ou F (falso) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
- O tamanho do cateter deve ser determinado pelo tamanho da uretra
 - Os cateteres plásticos são inflexíveis e, portanto, devem ser utilizados para cateterismos intermitente
 - Para preencher o balão, utilizar o volume determinado por cada fabricante e solução fisiológica
 - Em homens, a sonda deve ser fixada na parte interna da coxa
- Os pacientes com sonda vesical de demora devem ter sua região perineal higienizada 3 vezes ao dia e sempre após cada defecação
- F, F, V, V, F
 - V, V, F, F, V
 - V, V, V, F, F
 - V, F, F, V, V
5. **(Rede Sarah / 2012)** Em relação à limpeza da sala cirúrgica, indique V (verdadeiro) ou F (falso) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
- Considerada área crítica, recomenda-se realizar limpeza preparatória, limpeza operatória, limpeza concorrente e limpeza terminal.
 - A limpeza terminal reduz a contaminação ambiental, após a retirada do material sujo, requer uso de equipamento de proteção individual (EPI) para superfícies horizontais e verticais, é utilizado álcool a 70%.
 - Limpeza preparatória é realizada como uso de luva de procedimentos, campo estéril embebido com álcool a 70%, sempre que a sala estiver sem uso por mais de doze horas.
 - Quando há contaminação do chão com matéria orgânica, resíduo ou queda de material, recomenda-se a limpeza somente após o término do procedimento cirúrgico.
 - Recomenda-se a limpeza terminal após cirurgia de pacientes com doenças transmissíveis por aerossóis, é imprescindível o uso da máscara N95.
- V, V, F, F, V
 - F, F, V, V, F
 - V, F, F, F, V
 - F, V, V, F, V
6. **(Rede Sarah / 2012)** Vitória compareceu à unidade básica de saúde para realização do teste do pezinho. Tem 20 dias de vida. Nasceu de parto normal a termo. Chorou forte logo ao nascer, pesando 3,180 g e 49 cm de estatura. Recebeu a 1ª dose da vacina contra hepatite B na maternidade. No atendimento, apresentou peso de 3,550 g sendo que, na alta hospitalar, no terceiro dia de vida, seu peso foi de 2,990 g. A criança piscava ao estímulo sonoro, apresentava braços e pernas flexionados, mãos fechadas que se abriam espontaneamente e elevava a cabeça quando de bruços. Durante a amamentação, sugava bem o seio materno e observava seu rosto. Leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta.
- É recomendado que o teste do pezinho seja realizado na 1ª semana de vida da criança, a partir do 5º dia de vida.
 - Vitória apresenta desenvolvimento compatível com sua idade e classificado como normal.

- c. Vitória deverá receber vacina BCG e a vacina contra poliomielite neste dia em que veio fazer o teste do pezinho, não perdendo a oportunidade de manter a vacinação em dia.
- d. A perda de peso apresentada por Vitória do nascimento até o dia de alta pode ser considerada dentro do esperado.

7. (Rede Sarah / 2012) Uma criança com 45 dias de vida chega à unidade de saúde acompanhada de sua mãe, a qual relata que a criança não ganha peso, tem aceitado pouco o seu seio materno. A mãe amamenta cerca de 3 vezes ao dia e observa que, nesses momentos, a criança fica muito impaciente e chora. Assim, ela complementa as mamadas com 40 ml de NAN para acalmar a criança. Analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta.

- I – O aleitamento da criança é considerado exclusivo, pois a criança recebe leite diretamente do seio de sua mãe e recebe quantidade muito pequena de complementação.
- II – O trabalhador de saúde deve orientar a mãe que, após a fase de apojadura, que ocorre entre o 3º e o 4º dia após o parto, a lactação será mantida principalmente pela sucção de bebê e esvaziamento da mama.
- III – A criança poderá se sentir mais saciada se sua mãe oferecer o seio em horários rigorosamente regulares de 3 em 3 horas.
- IV – O trabalhador de saúde deve observar se o posicionamento do bebê e a pega estão adequados, se o bebê abocanhou o mamilo até a região da aréola e se o movimento da mandíbula é típico de deglutição.
- V – O trabalhador de saúde deve dar apoio emocional e ouvir a mãe sobre dúvidas e insegurança e também avaliar o real ganho de peso da criança.

- a. Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- b. Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- c. Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d. Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

8. (Rede Sarah / 2012) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher preconiza diversas ações, exceto:

- a. Assistência em planejamento familiar com oferta e acesso a métodos contraceptivos para mulheres e homens.
- b. Atendimento integral de qualidade e humanizado de pré-natal e puerpério nas unidades básicas, desde que previamente agendadas.
- c. Atenção clínica às queixas ginecológicas a mulheres, mesmo se portadoras de infecções sexualmente transmissíveis.
- d. Garantia de acesso a qualquer serviço de rede de atenção à saúde que possibilite melhor resolutividade dos problemas e acompanhamento das mulheres.

9. (Rede Sarah / 2012) Sobre vigilância epidemiológica, assinale a alternativa correta.

- a. A atenção básica constitui-se local privilegiado para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis.
- b. Cabe somente ao médico notificar a ocorrência de um caso de doença ou agravo à autoridade sanitária a partir da suspeição, independentemente de sua confirmação diagnóstica.
- c. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que compreende coleta e processamento de dados, investigação epidemiológica de casos e surtos, recomendação e promoção de ações de controle e prevenção de doenças exclusivamente de natureza transmissível.
- d. Cabe à vigilância epidemiológica realizar ações relacionadas a produtos e serviços tais como: alimentos, bebidas, medicamentos veterinários, cosméticos e perfumes, cigarros, entre outros.

10. (Rede Sarah / 2012) Sobre a estratégia Saúde da Família, analise as alternativas abaixo, indicando V (verdadeiro) ou F (falso). Em seguida, assinale a alternativa correspondente.

- () As ações na estratégia Saúde da Família são planejadas de acordo com a população de sua área de abrangência e a produtividade potencial dos recursos humanos disponíveis
- () A adscrição da clientela, a construção de vínculo e corresponsabilização entre equipe e população permitem o acompanhamento longitudinal e a continuidade das ações.
- () Os atributos da atenção primária em saúde, acessibilidade, foco na família e na comunidade são princípios observados no desenvolvimento da estratégia saúde da família.
- () Compete ao técnico de enfermagem da equipe de Saúde da Família participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidade.
- () Visita domiciliar é uma ação de competência do agente comunitário e do médico da Saúde da Família, e a participação do técnico de enfermagem deve ocorrer somente mediante necessidade de realizar curativos e verificação de sinais vitais no domicílio.

- a. V, F, V, F, V
- b. V, F, F, V, F
- c. F, V, F, F, V
- d. F, V, V, V, F

11. **(Rede Sarah / 2012)** De acordo com as últimas diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP (Suporte Básico de Vida) para indivíduos adultos em parada cardiorrespiratória, publicado em 2010, analise as afirmativas abaixo, indicando V (verdadeiro) ou F (falso). Em seguida, assinale a alternativa correspondente.
- () A avaliação da respiração “ver, ouvir e sentir” foi mantida do algoritmo de Suporte Básico de Vida
 - () A sequência via aérea, respiração compressões torácicas (A-B-C) foi alterada para compressões torácicas, via aérea, respiração (C-A-B)
 - () A relação compressão-ventilação deve ser de 30:2 para único socorrista de adultos.
 - () A frequência de compressão mínima deve ser de 100/minuto.
 - () Evitar excesso de ventilação.
- a. V, F, V, F, V
b. F, V, F, V, F
c. F, V, V, V, V
d. V, F, F, F, F
12. **(Rede Sarah / 2012)** Uma pessoa de 25 anos, vítima de acidente automobilístico, que ficou paraplégica, internou-se para reabilitação e tem história prévia de crises convulsivas (tônico-clônica) frequentes. Nesse caso, a alternativa correta para a prioridade do cuidado de enfermagem é:
- a. Prevenir o paciente de lesões
 - b. Restaurar a integridade de pele
 - c. Melhorar a mobilidade do paciente
 - d. Nenhuma das alternativas anteriores está correta
13. **(Rede Sarah / 2012)** Um paciente de 80 anos com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica tem prescrição de soroterapia. Assinale a alternativa incorreta em relação aos cuidados de enfermagem.
- a. As veias dos membros inferiores devem ser preferidas às dos membros superiores, por não limitarem a movimentação do paciente.
 - b. Escolher uma veia flexível e evitar extremidades com circulação comprometida.
 - c. Deve-se trocar o acesso venoso periférico a cada 72 horas, exceto se complicações ocorrerem, como sinais de infecção e infiltração.
 - d. Recomenda-se a utilização de material asséptico para a fixação do acesso.
14. **(Rede Sarah / 2012)** Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico está apresentando dificuldade para deglutição. Foi prescrita alimentação por sonda nasogástrica. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem.
- a. Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 30°, checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da dieta a cada 24 horas (sistema fechado), a alimentação deve estar em temperatura ambiente.
 - b. Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 30°, checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da dieta a cada 24 horas (sistema fechado), a alimentação deve estar em temperatura fria, pois diminui o risco de contaminação e de diarreia.
 - c. Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 60°, checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da dieta a cada 12 horas (sistema fechado), a alimentação deve estar em temperatura ambiente.
 - d. Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 60°, checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da dieta a cada 24 horas (sistema fechado), a alimentação deve estar em temperatura fria, pois diminui o risco de contaminação e de diarreia.

GABARITO

- 1. B
- 2. D
- 3. C
- 4. B
- 5. A
- 6. C
- 7. D
- 8. B
- 9. A
- 10. D
- 11. C
- 12. A
- 13. A
- 14. A



O MAIOR DO BRASIL NO CONFORTO DE SUA CASA

- . Mais de 20.000 videoaulas sob demanda.
- . 3.000 cursos por pacote, por matéria ou extensivos.
- . 26 anos de tradição em concursos.

DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS:

- ✓ Material didático da Editora Gran Cursos
- ✓ Acesso a um banco com + de 150.000 questões
- ✓ Simulados online corrigidos em tempo real
- ✓ Ranking de notas
- ✓ Indicadores sobre a sua preparação
- ✓ Monitor de desempenho
- ✓ Recursos para anotações
- ✓ Certificação gratuita
- ✓ Compatível com iPad, iPhone e iPod
- ✓ Parcelamento em até 12x sem juros
- ✓ E muito mais



O Gran Cursos Online oferece a você **ACESSO GRATUITO** a 25 VIDEOAULAS de Gramática, Informática, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Conheça a metodologia que mais aprova. Acesse www.grancursosonline.com.br/curso-gratis.

4007-2501

Capitais e regiões metropolitanas: (valor de uma ligação local)

0800-607-2500

Para demais localidades

NÃO PERCA MAIS TEMPO. COMECE A SUA PREPARAÇÃO HOJE MESMO!



www.grancursosonline.com.br